

ÜBER DIE
HÄUFIGKEIT DER HERZERKRANKUNGEN
IN MÜNCHEN.

INAUGURAL-DISSERTATION
ZUR
ERLANGUNG DER DOCTORWÜRDE
IN DER
CHIRURGIE, MEDICIN UND GEBURTSHILFE
UNTER DEM PRÄSIDIUM
DES
HERRN PROFESSOR DR. O. BOLLINGER
VORSTAND DES PATHOLOGISCHEN INSTITUTES.

DER
HOHEN MEDICINISCHEN FACULTÄT ZU MÜNCHEN
VORGELEGT
VON
BENNO SCHMIDBAUER
APPROB. ARZT.

MÜNCHEN 1883.
DRUCK VON KNORR & HIRTH IN MÜNCHEN.

SEINEN
LIEBEN ELTERN

IN

INNIGSTER LIEBE UND DANKBARKEIT

GEWIDMET

VOM VERFASSER.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

VORLIEGENDE Arbeit hat sich die Aufgabe gestellt, jene Herzerkrankungen einer näheren Erörterung und Besprechung zu unterziehen, welche als reine Hypertrophien mit und ohne Muskeldegeneration speciell in München häufig angetroffen werden. Da es zur Lösung dieser Aufgabe nothwendig erscheint, die Maass- und Gewichtsverhältnisse des Herzens zu berücksichtigen, so soll zuvörderst der wichtigsten bisher am Herzen geübten Messungsmethoden gedacht werden, in zweiter Linie sollen die wichtigeren Angaben aus der Geschichte der Herzhypertrophie, der Zusammenhang dieser Erkrankung mit den anderweitigen Herz- und Organerkrankungen — vorwiegend nach den Ergebnissen von 1000 Sectionsbefunden aus dem hiesigen pathologischen Institute — erwähnt und betrachtet, zum Schlusse der ursächlichen Momente dieser Erkrankung gedacht werden.

Die Betrachtung des Herzens als eine Kraftmaschine, welche die im menschlichen Körper functionirenden Arbeitsmaschinen mit dem zur Leistung der Arbeit erforderlichen Material zu versorgen hat, liess es schon lange wünschenswerth erscheinen, über die Grösse des Herzens und seiner einzelnen Theile bestimmte, in Zahlen ausgedrückte Kenntnisse zu erlangen und diese durch Messung und Wägung festzustellen.

Bizot war einer der Ersten, der durch eine einfache und leicht ausführbare Methode, welche die bei einer solchen Messung unvermeidlichen Fehlerquellen auf ihr geringstes Maass reducirte und doch alle wissenswerthen Punkte berücksichtigte, den Versuch der Aufstellung von Normalzahlen für den Herzmuskel glücklich löste. Die von ihm aus 152 Herzen aufgestellten Mittelwerthe gelten noch heute als Mittelmaasse für die Dimensionen des Herzens.

So ungenau der erste Theil seiner Methode, durch den Bizot die Dimensionen des ganzen uneröffneten Herzens zu bestimmen suchte, bei dem Mangel scharf markirter Punkte für den Ansatz

des Maassstabes erscheint, um so präciser ist Bizot's Verfahren bei der Messung des geöffneten Herzens. War der linke Ventrikel durch einen am stumpfen Rande von der Spitze bis in die Aorta geführten Schnitt eröffnet, so wurde bestimmt:

1. der Umfang der Basis des Ventrikels, d. i. die Länge einer durch die Höhe der convexen Ränder der Valv. sigmoid. gezogene Linie;

2. die Höhe des Ventrikels d. i. eine Linie von der Spitze auf die Basis senkrecht geführt;

3. die Dicke der Herzwand, gemessen an der Basis, am obersten Drittel und 4 Linien oberhalb der Spitze; an eben diesen Punkten wurde die Dicke des Septum ventric. gemessen. Das Orificium atrio-ventr. wurde längs der Adhäsionslinie der Valv. mitr. bestimmt. In ähnlicher Weise verfuhr Bizot bei der Messung des rechten Ventrikels.

Mit einigen Modificationen wurde diese Methode Bizots von Peacock in seinem: »On the weights and dimensions of the heart in health and disease« beibehalten, dagegen lässt sich in seiner Arbeit ein wesentlicher Fortschritt darin erkennen, dass er diesen Bestimmungen noch die Gewichtsverhältnisse des Herzens beifügte und dem Einflusse, den anderweitige Organerkrankungen auf die Dimensionen des Herzens auszuüben im Stande sind, eingehende Berücksichtigung schenkte. Von einigen weiteren Arbeiten nur den Namen ihrer Verfasser als Bouillaud Clendinning, Reid erwähnend, wende ich mich zur Arbeit Engels. »Ueber einige pathologisch-anatomische Verhältnisse des Herzens.«

Wie Peacock machte auch Engel von der Gewichtsbestimmung des ganzen Herzens Gebrauch, fügte dieser aber noch die Wägung der einzelnen von einander abgetrennten Ventrikel hinzu. Aus diesen Bestimmungen schliesst er auf den Einfluss der verschiedensten Erkrankungen des Organismus auf die einzelnen Herzabschnitte. Der Sorgfalt und dem Eifer aber, den Engel offenbar bei seiner Arbeit bethätigte, entspricht keineswegs, wie er selbst glaubt, der Erfolg, wenn er am Schlusse seiner Arbeit schreibt; »Ausgeprägte Fälle von Hypertrophie erkennt man auch ohne Beihilfe der Wage und hat sie bisher immer erkannt, zur Entscheidung zweifelhafter Fälle reicht weder diese noch eine andere Methode hin. Es liegt dies übrigens in der Natur der Sache; denn zwischen Gesundem und Krankem bestehen nirgends scharfe Grenzen; die Krankheit ist eben ein Vorgang, der sich nicht nach Pfunden und Lothen noch nach Zollen und Linien bemessen lässt.«

War es dieser entmuthigende Schluss aus dem Munde eines so erfahrenen Forschers, war es die Unzulänglichkeit der angewandten Untersuchungsmethoden, lange Zeit schien die Forschung

auf diesem Gebiete völlig stille zu stehen. Erst in der neuesten Zeit wurde dem Gegenstande der Herzmessung und Wägung neue Beachtung geschenkt. So erschienen durch kurze Zeitabschnitte von einander getrennt die bedeutenden Arbeiten von Beneke, Buhl, als deren Fortsetzung die Arbeit von B. Spatz »Einfluss von Krankheiten auf die Grösse des Herzens (Ziemssen's Archiv Bd. XXVIII) gelten kann, — von Thoma und in der neuesten Zeit die treffliche Arbeit von W. Müller in Jena.

Der Mangel an Uebereinstimmung in den bisher angewandten Methoden, der eine directe Vergleichung der gefundenen Resultate unzulässig erscheinen lässt, veranlasste Müller, die Muskelsubstanz des Herzens allein mit sorgfältiger Entfernung aller Adnexa und selbst des in der Muskelsubstanz abgelagerten Fettes in Betracht zu ziehen. Mit dieser denkbar genauesten Methode, bei deren Anwendung er übrigens nicht unterlässt, Alter, Geschlecht, Körperlänge und Körpergewicht in Betracht zu ziehen, hat er den Misserfolg, den Engel beklagt, nicht zu fürchten und es gelingt ihm, dem bisher unerreichbar erschienenen Ziele, der Aufstellung fester Normalzahlen, bedeutend näher zu rücken.

Wenn ich gleichwohl in vorliegender Arbeit die Methode Müller's nicht befolgte, so geschah dies aus folgenden Gründen:

1. die Arbeit Müller's erschien zu einer Zeit, wo ich den statistischen Theil der Arbeit bereits beendet hatte;

2. fand ich sowohl durch einige nachträglich angestellte Wägungen (wobei nach Müller's Vorgang das Epicardialfett sorgfältigst entfernt wurde) wie aus einzelnen Angaben Müller's, dass die auf und im Muskel abgelagerte Fettmenge in den hochgradigsten Fällen zwischen 40—50 gr beträgt und dass das Belassen der grossen Gefässe in einer Länge von ca. 3 cm eine weitere Vermehrung des Herzgewichtes um 10 gr zur Folge hat, so dass im höchsten und seltensten Falle die einzelne Wägung um 50—60 gr, für gewöhnlich nur um 10 gr zu hoch angesetzt wurde, ein Umstand, der bei den colossalen Herzgewichtes, wie sie sich bei Myodegeneratio cordis finden, die Wägungsergebnisse nicht besonders schädigen dürfte.

Was die Methode betrifft, nach der im hiesigen pathologischen Institute zur Bestimmung der Dimensionen der verschiedenen Herzabschnitte verfahren wird, so wird die Wägung des Gesammtherzens mit der Messung der einzelnen Ventrikel verbunden.

Der Wägung des Herzens ist die Bestimmung des Körpergewichtes und der Körperlänge vorausgegangen; daraus ergibt sich das Verhältniss des Herzgewichtes zum Körpergewichtes, sowie die Möglichkeit, zur Erleichterung der Vergleichung die Fälle auf eine einheitliche Basis reduciren zu können. Zur Wägung wird das Herz, nach Durchtrennung der grossen Gefässe, etwa 3 cm vor ihrer Einmündung von dem etwa in den Ventrikeln

und Vorhöfen enthaltenen Fibringerinnsel und Blute durch Aufgiessen von Wasser sorgfältigst gereinigt und alsdann auf eine Schnellwaage gebracht, die öfters in Bezug auf ihre Genauigkeit controlirt wird.

Der Wägung des Herzens ist aber bereits die Messung der beiden Ventrikel vorausgegangen. Diese hat folgende Punkte zu bestimmen:

1. die Grösse der beiden Ventrikel.

Um mit dem Maassstabe den Rauminhalt der Ventrikel zu messen, müsste man eigentlich die drei auf einander senkrechten Durchmesser derselben bestimmen, allein auch dies wäre umständlich und ungenau. Es wird darum einfach, wie dies schon Bizot that, die Höhe des Ventrikels gemessen, in der Voraussetzung, dass diese zu den übrigen Dimensionen in einem bestimmten Verhältnisse steht und so eine hinreichend genaue Vorstellung von der Capacität der Kammer gibt. In den meisten Fällen steht nämlich die Höhe zum Rauminhalt in Proportion und wächst proportional mit zunehmender Dilatation. Zur Bestimmung dieser Grösse wird der Ventrikel, etwa 1 cm vom Sulcus longitudinalis entfernt, eröffnet, ein schmaler Maassstab an die Hinterwand angelegt und die Entfernung der Spitze bis zu dem mittleren gemeinsamen Insertionspunkte zweier Semilunarklappen abgelesen.

Zur Bestimmung der Weite der Pulmonalis und Aorta werden dieselben durch Verlängerung des den Ventrikel senkrecht eröffnenden Schnittes mit der Scheere eröffnet; sodann wird der Maassstab auf die Gefässwandung gelegt, dieselbe leicht ange-drückt und eine die drei Insertionspunkte je zweier Klappen verbindende Linie gemessen.

Der Muskel selbst wird etwa in der Mitte zwischen Spitze und Basis, also an der stärksten Partie der senkrecht durchschnittenen Wandung, gemessen.

Was nun die Herzhypertrophie betrifft, so versteht man darunter eine Zunahme des Muskelgewebes des Herzens. Dieselbe kann auf zweifache Weise zu Stande kommen: entweder durch Zunahme jedes einzelnen Myocardelementes oder bei gleichbleibendem Umfange der einzelnen Fasern durch Vermehrung derselben. Man spricht in letzterem Falle von Hyperplasie des Muskelgewebes im Gegensatze zur eigentlichen Hypertrophie; begreiflicher Weise ist eine Combination beider Fälle nicht ausgeschlossen. Die Ansichten über die histologischen Veränderungen bei der Hypertrophie des Herzmuskels sind noch getheilt. Hepp, Wedl, Förster, Friedrich haben sich für Hypertrophie, Rindfleisch dagegen für Hyperplasie der Herzmuskelfasern ausgesprochen. Der neueste Autor, Letulle, tritt wieder für Hypertrophie ein. Er behauptet, dass die ersten Ver-

änderungen an den Muskelzellen in zerstreuten Gruppen auftreten, deren Vertheilung jedoch weder mit der Anordnung der Blutgefässe noch mit der Gruppierung der secundären Muskelbündel im Zusammenhang steht. Die Breite der einzelnen Muskelzellen kann um das 15fache des normalen Maasses zunehmen, doch soll dieselbe 0,31—0,33 mm nicht überschreiten. Eine Vermehrung der Muskelkerne findet nicht statt, obschon dieselben Verbildungen erkennen lassen.

Nicht selten besteht auch eine Zunahme des intermuskulären Bindegewebes und selbst an den Nerven haben Lee und Cloetta Verdickungen gesehen, von denen es jedoch noch aufzuklären bleibt, ob dieselben auf Zunahme des einhüllenden Bindegewebes oder auf Hypertrophie der einzelnen Nervenfasern beruhen.

Man hat früher noch von echter und unechter Hypertrophie gesprochen. Als unechte Herzhypertrophie bezeichnete man Verdickungen der Muskelwände des Herzens, welche nicht durch Zunahme des Muskelgewebes, sondern durch bindegewebige Schwielen, Neubildungen des Herzmuskels und Aehnliches erzeugt waren.

Ein hypertrophischer Herzmuskel zeichnet sich vor allem durch abnorme Verdickung der Herzwandung aus. Da fast ohne Ausnahme mit der Hypertrophie des Herzmuskels Dilatation der Herzhöhlen verbunden ist, so entstehen gleichzeitig sehr bedeutende Vergrösserungen des Herzvolumens, wie man sie bei einfacher Dilatation nicht gut zu sehen bekommt. Die Combination von Dilatation und Hypertrophie des Herzens wird als excentrische Hypertrophie bezeichnet. Mit dem Ausdrucke concentrische Herzhypertrophie hat man Veränderungen belegt, bei denen nicht nur nicht Dilatation des Herzraumes besteht, sondern letzterer gerade in Folge der Hypertrophie des Herzmuskels verengt wird. Diese Verengerung soll so hochgradig werden können, dass die Höhle des linken Ventrikels kaum für den Umfang des kleinen Fingers Platz besitzt. Manche Autoren haben das Vorkommen einer concentrischen Hypertrophie ganz und gar geleugnet, sie erklären dieselbe als eine Leichenerscheinung, welche dadurch entsteht, dass beim Eintritte des Todes das Herz in Systole stehen bleibt. Rokitansky und von Bamberger geben ihr Vorkommen für seltene Fälle zu. Namentlich hat man sie dann mehrfach beschrieben, wenn Mitral und Aortenklappenfehler zugleich am Herzen bestanden (v. Bamberger, Law).

Vor allem hat man sich zu hüten, jede Verdickung des Herzmuskels und Verkleinerung der Herzhöhlen als concentrische Hypertrophie aufzufassen. Man trifft diese Veränderungen als Leichenerscheinung bei Leuten, die an Verblutung, in Folge grosser Säfteverluste gestorben sind und Cruveilhier gibt

an, dass man dieses mehr zufällige Vorkommniss von vitalen Veränderungen dadurch unterscheiden kann, dass sich die vermeintliche Hypertrophie durch Druck mit der Faust leicht ausgleichen und beseitigen lasse.

Nachdem wir so im Vorstehenden die anatomischen Verhältnisse bei der Hypertrophie des Herzens erwähnten, möchte ich im Anschluss daran noch eines Zustandes gedenken, der wie die Herzhypertrophie eine Vermehrung des Herzgewichtes zur Folge hat und der sich in seinen klinischen (wie ätiologischen) Erscheinungen derselben völlig analog verhält, ich meine jene Veränderung am Herzmuskel, die gemeinhin als Fettherz bezeichnet wird. Die Myodegeneratio cordis bildet nach der Ansicht verschiedener Autoren (Buhl, Spatz, Stein) abgesehen von den Fällen, wo sie nach akuten Ernährungsstörungen, nach Phosphor- und Arsenikvergiftung, nach perniciöser Anämie auftritt, das Endstadium der meisten entzündlichen Prozesse am Herzen. Diese pathogenetische Auffassung der Myodegeneration cordis ist wohl mehr hypothetischer Natur, da sich direct entzündliche Veränderungen oder deren Spuren am Herzen nicht nachweisen lassen. Nach der Ansicht von Prof. Bollinger sind die meisten hiehergehörigen Fälle von vornherein degenerativer Natur und kommen allerdings häufig in hypertrophischen Herzen vor und vielfach auch in Verbindung mit Endo- und Myocarditis.

Berücksichtigt man die früheren Angaben über die fettige Degeneration des Herzmuskels, so wurde bereits dort der Unterschied zwischen fettiger Infiltration und fettiger Degeneration aufrecht gehalten und nicht minder scharf betont, wie dies in neuester Zeit von Leyden, Zeitschrift f. klin. Medicin 1882, geschah.

Es ist merkwürdig, dass die pathologische Veränderung der fettigen Degeneration bereits zu einer Zeit, wo das Mikroskop noch nicht zur Anwendung kam, von Laënnec genau beschrieben und von der Fettwucherung des Herzüberzuges unterschieden wurde. Laënnec sagt, dass diese Anhäufung des subpericardialen Fettes nichts zu thun habe mit der krankhaften Veränderung, welche auf einer fettigen Entartung des Herzens einer Infiltration der Muskelsubstanz durch eine Materie, die alle physischen und chemischen Eigenschaften des Fettes besitzt, beruht.

Die mikroskopischen Beobachtungen der Neuzeit können seine Worte nur bestätigen, ausserdem aber noch hinzufügen, dass die subpericardiale Fettwucherung häufig von einer chronischen Ernährungsstörung herzuleiten ist, während die hier zu beschreibende Fettdegeneration des Herzmuskels einer akuten (so bei Phosphor- und Arsenikvergiftung, bei perniciöser Anämie) sowohl wie chronischen (so bei Alcoholismus) Ernährungsstörung zuzuschreiben ist.

Mit Umgehung der anderwärts vielfach und trefflich geschilderten — sowohl makroskopisch als ganz besonders mikroskopisch-erkennbaren — Eigenthümlichkeiten des fettig degenerirten Herzmuskels wende ich mich zur Betrachtung des *Cor adiposum*.

Analog der Fettdegeneration in anderen Organen des Körpers findet sich diese Metamorphose (wie Wagner nachwies und Leyden neuerdings bestätigte) auch am Herzen, ohne dass ein selbstständiger Krankheitsprozess am Herzen vorausgegangen wäre, sie fällt dann zusammen mit der Fettmetamorphose anderer Organe, der Leber, Nieren. Diese akute Form der Myodegeneratio cordis, wie sie nach Phosphor-Arsenikvergiftung zur Wahrnehmung kommt, ist dann nur der Ausdruck einer allgemeinen Ernährungsstörung. Unter Fettmetamorphose ist nach Samuel (Handbch. d. allg. Pathol. u. pathol. Physiologie) nicht eine Ablagerung von Fett aus dem Nahrungsfett in den Zellen, sondern eine regressive Metamorphose der Eiweisssubstanz der Zellen selbst zu verstehen. Aus den Untersuchungen v. Voit's ergibt sich, dass sich aus Eiweiss unter Abspaltung eines stickstoffhaltigen Atomcomplexes Fett bilden kann. Weitere Untersuchungen und Erfahrungen aus der Pathologie lassen es sehr wahrscheinlich erscheinen, dass dieses Vermögen den Zellen wenigstens aller eiweissartigen der meisten Organe zukommt. Normaler Weise wird nach Cohnheim (Handbch. d. allg. Pathologie Bd. I) dieses aus Eiweiss abgespaltene Fett entweder durch den hinzutretenden Sauerstoff verbrannt oder durch nachrückendes Nahrungseiweiss verdrängt und in die Fettdepots abgeführt. Bei Sauerstoffmangel jedoch und verringerter Nahrungszufuhr bleibt das Fett in den Zellen liegen und schwächt und vernichtet dadurch ihre physiologische Function.

Es handelt sich also nicht um einen eigenen Prozess im Herzen selbst, sondern der Herzmuskel nimmt in der ihm eigenthümlichen Weise an der Ernährungsanomalie Theil, welche Folge der Bluterkrankung ist und zeigt diesen Einfluss ebenso in der Beeinträchtigung seiner Function, wie seiner histologischen Beschaffenheit (Leyden).

In weitaus der Mehrzahl der Fälle findet sich fettige Degeneration des Herzmuskels als Begleiterscheinung anderweitiger Krankheitsprozesse, sei es, dass dieselben eine stark verminderte Blutzufuhr bedingen, — so erklärt Leyden die fettige Degeneration des rechten Ventrikels bei Zuständen chronischer Cyanose, die des linken bei Insufficienz der Aortaklappen — oder dass dieselben als Entzündungserscheinungen am Herzen selbst auftreten. In letzterer Beziehung bildet die Fettmetamorphose des Herzmuskels das Endstadium der akuten Myocarditis, der akuten Endocarditis, die Folge schwerer Pericarditis.

Im Gegensatze zu der oben erwähnten akuten Fettmetamorphose des Herzens möchte ich die ebenfalls idiopathische und auf toxischen Einflüssen beruhende chronische Fettdegeneration betrachten. In einem ziemlich bedeutenden Prozentsatze fand sich — wie aus Tab. I. ersichtlich — hochgradige Fettdegeneration des Herzens bei Hypertrophie und vielfach auch bei Dilatation des Herzens, während der übrige Sectionsbefund völlig negative Resultate ergab. Aus der pathologischen Beschaffenheit des Herzens allein konnte die Todesursache erklärt werden.

Die zur Betrachtung verwandten Sectionen vertheilen sich in der Weise, dass von den im Jahre 1881 im pathologischen Institute gemachten Sectionen die ersten hundert unberücksichtigt bleiben mussten, da erst späterhin die nun gebräuchliche und des Weiteren eingangs ausführlich beschriebene Messungs- und Wägungsmethode zur Anwendung kam. Um nun das Material auf tausend Fälle abzurunden, habe ich diese nicht berücksichtigten 100 Leichenbefunde durch die ersten hundert Fälle aus dem Jahre 1883 ersetzt.

Bei der Zusammenstellung verfuhr ich, wie dies auch aus den Tabellen ersichtlich, so, dass vor allem auf das Gewicht des Herzens geachtet wurde, weil, wie ich glaube, dadurch der Einzelfall besser illustriert wird, als durch die Angabe der Ventrikelhöhe und — Dicke; Gewicht und Länge des Körpers mussten diesen Wägungen als für die Beurtheilung nothwendig beigelegt werden. Hinsichtlich der ersten Tabelle dürfte auffallend erscheinen, wie das männliche Geschlecht hinsichtlich der Häufigkeit der Hypertrophie und Dilatation des Herzens über das weibliche prävalirt, weiterhin aber wie gerade dort das zweite und dritte Decennium, hier dagegen erst das vierte und fünfte mit beträchtlicher Hypertrophie hervortritt. Bei dem aus allen Schichten der Bevölkerung — vorwiegend jedoch aus den körperliche Arbeit verrichtenden — stammenden Sectionsmaterial eines pathologischen Institutes erschien es mir nicht ganz uninteressant, den Stand des Verstorbenen anzugeben und glaube ich damit zugleich einen Commentar zu den späterhin zu besprechenden ursächlichen Momenten der Hypertrophie und Dilatation des Herzens in München gegeben zu haben. In seiner Arbeit über das Tübinger Herz hebt Münzinger auf Grund von 40 Sectionen die Häufigkeit der Herzhypertrophie und Dilatation bei der zum grossen Theil mit Weinbau beschäftigten Bevölkerung Tübingens hervor; Münzinger erblickt in der anstrengenden Beschäftigung der Weinbauern das hauptsächlichste Moment für die Entstehung der Herzhypertrophie. Dem Einwande, als ob es sich hier in München um ähnliche Arbeitshypertrophie handle, glaubte ich am besten durch Angabe des

Standes des betreffenden Individuums zu begegnen. Die grossen Schwierigkeiten, die sich bei allen Eintheilungen und Schematisirungen ergeben, haben sich natürlich auch hier herausgestellt.

Der Uebersicht halber wurden in Tab. I. alle jene Fälle, bei denen die Herzerkrankung allein die Todesursache bildete, angeführt, weiterhin in Tab. II die Complication der Herzerkrankung mit einer anderweitigen Organerkrankung zusammengestellt, dabei aber wieder strenge unterschieden zwischen Erkrankungen des Organismus, welche etwa secundär (Lungenemphysem, Atheromatose) eine Hypertrophie des Herzens herbeizuführen im Stande sind, und solchen, welche ohne nachweisbare Beeinflussung der Circulationsorgane den Tod des Individuums herbeizuführen vermochten (Tab. II.)

In einer weiteren Tabelle (IV) wurden die Fälle von Cor adiposum zusammengestellt. — Von den eigentlichen Herzkrankheiten tragen Klappenfehler am meisten zu Grössenveränderungen und zu Störungen des mechanischen Gleichgewichtes der einzelnen Herzabtheilungen bei. Ihre Wirkungen sind jedoch so einfach erklärlich und entsprechen so scharf der physikalischen Calculation, dass es eigentlich überflüssig erscheinen dürfte, sie einer Besprechung zu unterziehen. Die verschiedenen Grade der Hypertrophie und Dilatation, die wir hier vorfinden, richten sich eben nach dem Grade der vorhandenen Stenose oder Insufficienz und nach der Zeitdauer, während der sie bis zum erfolgten Tode bestanden. Gleichwohl wurden in Tab. V die verschiedenen Grade von Klappenfehlern berücksichtigt, einerseits um eine Vorstellung von der Häufigkeit dieser Erkrankung, als deren Ursache vielfach klimatische Einflüsse angeschuldigt werden, zu gewinnen, anderseits um auf die Häufigkeit der neuerdings von Leyden erwähnten Endocarditis puerperalis hinzuweisen. Weiterhin aber glaube ich, dass ein ziemlicher Theil dieser Klappenfehler wenigstens alle jene, die als relative Insufficienzen bezeichnet werden, durch eine fettige Degeneration des Herzmuskels hervorgerufen werden können. In solchen Fällen dürfte dann die Fettentartung des Muskels eine besondere Bedeutung dadurch erlangen, dass durch dieselbe die Wirkung der Hypertrophie die Ueberwindung des dieselbe bedingenden Hindernisses unmöglich wird und eine Parese des Muskels erfolgt.

Aus der Betrachtung vorstehender Tabellen ergibt sich die statistisch erhärtete Thatsache, dass in München im Vergleich zu andern Städten ein unverhältnissmässig höherer Procentsatz von Herzaffectationen vorkommt.

So ergibt sich aus den Berichten des pathol. Institutes in Berlin für das Jahr 1877 bei 809 Fällen:

Phthisis und Tuberculose in 230 Fällen (häufigste Todesursache)
Endocarditis in 35 Fällen (5. häufigste Todesursache),

bei 717 Fällen (Jahr 1878):

Phthisis 168 Fälle (häufigste Todesursache)
Endocarditis 46 Fälle (4. häufigste Todesursache)
Pericarditis 4 Fälle (32. häufigste Todesursache).

Als rein idiopathische Myodegeneratio cordis finde ich von Leyden nur einen Fall erwähnt. Wie ganz anders lauten dagegen die Zahlen aus dem hiesigen patholog. Institute!

Hinsichtlich der Frequenz stellen sich hier die Herzerkrankungen unmittelbar neben die Fälle von Lungenschwindsucht und Tuberculose. In den Jahren 1876 und 77 trafen auf 1058 Leichen

Phthisiker 328 = 31 %
Krankheiten des Herzens 123 = 11,6 %

In den beobachteten 1000 Fällen waren

	Ma	W
(Tab. I) I. Rein idiopathische Hypertr.	32 + 14 = 46	= 4,6 %
(Tab. II) I. Rein idiopathische Hypertr.	23 + 10 = 33	= 3,3 %
(Tab. III) Sekund. Erkrankg. d. Herzens	49 + 20 = 69	= 6,9 %
(Tab. IV) Cor adiposum	21 + 11 = 32	= 3,2 %
(Tab. V) Klappenfehler	49 + 62 = 111	= 11,1 %

Ungerechnet die Fälle von Hypertrophie und Dilatation des Herzens bei Phthisis pulmonum!

Man hat diese Erscheinung vielfach auf klimatische Einflüsse, auf rasch eintretende Schwankungen in der Atmosphäre zurückgeführt. Damit dürften aber nicht alle Erkrankungen des Herzens, vor Allem nicht die hier zu Lande so unverhältnissmässig häufige rein idiopathische Hypertrophia cordis erklärt sein (S. Tab. I und II).

Als sie bedingendes Moment glaube ich die Lebensweise der hiesigen Bevölkerung, vor Allem den unglaublich grossen Bierconsum beschuldigen zu dürfen. Dieser erklärt denn auch die Häufigkeit der Nierenerkrankungen.

Der Bierconsum betrug nach v. Voit im Jahre 1874 für den Kopf der Bevölkerung in Liter:

In Belgien	158 Liter
In England	139 »
Im deutschen Reiche	98 »
In Oesterreich	37 »
In Frankreich	21 »
In München	566 »

Pro Tag ergiebt sich daraus für die Einzelperson in München — also Säuglinge, Kinder und Frauen mit eingeschlossen — 1 1/3 Liter und das Bier zu 4% absolutem Alcohol berechnet 53 ccm davon. Dieses Quantum multiplicirt sich natürlich bei der biervertilgenden Männerwelt um das 2—10fache für die Einzelperson und gibt dann eine Ziffer, die in Bezug auf die

Alcoholmenge dem Gewohnheitsquantum der Branntweintrinker nahe oder gleichkommt.

Ich möchte an dieser Stelle an die Worte des Prof. Binz über den Unterschied von Branntwein- und Bierconsum erinnern, durch welche die Bedeutung eines übermässigen Bierconsums hinlänglich illustriert wird:

»Man täuscht sich fast allgemein über die Quantitäten des absoluten Weingeistes, die man beim Biertrinken verzehrt. Wenn der Hafenarbeiter in feuchter Kälte oder der Schnitter in heisser Sonne ein Glas Branntwein oder aus der Flasche einen kräftigen Schluck nimmt, so kann man im Durchschnitte diesen auf höchstens 10 ccm absoluten Alcohol berechnen. Wenn dagegen der Stammgast der Bierkneipe 1 Liter Bier consumirt — und wie rasch pflegt das zu verschwinden! — so gehen damit gegen 40 ccm absoluten Alcohols in die Säfte über. Zu Gunsten dieser 40 ccm lässt sich sagen, dass sie eingehüllt sind in 960 ccm Wasser, während beim Branntwein nur etwa 10 ccm Wasser die Hülle bilden; aber man weiss, wie rasch jenes Wasser den Körper wieder verlässt, während der Alcohol eine Zeit lang bleibt. Und zu Ungunsten des mit dem Biere aufgenommenen Alcohols muss gesagt werden, dass weder körperliche Anstrengung noch atmosphärischer Einfluss sein Verbrannt- und Verzehrtwerden im Organismus unterstützt, sondern dass er einem träge in meist dumpfer qualmiger Atmosphäre daisitzenden Körper einverleibt wird, der ihm die Möglichkeit gewährt, es recht lange bei ihm auszuhalten und seine Nervenzellen in immer wiederholtem Kreise zu umspülen.«

So zutreffend vorstehende Schilderung für den »Stammgast der Bierkneipe« erscheinen mag, so ist doch hinwiederum zu bedenken, wie der Bier- und Branntweingenuss sich in den verschiedenen Theilen unseres deutschen Vaterlandes gegenseitig ergänzen, so dass die Menge des genossenen Alcohols nahezu dieselbe bleibt. Es wurden (Rosenthal, Bier und Branntwein) im Jahre 1879/80 produziert pro Kopf der Bevölkerung:

	Bier		Branntwein	
In Bayern	232	Liter	2,4	Liter
Sachsen	105	»	9,6	»
Schlesien	48,7	»	15,8	»
Pommern	31,1	»	20,5	»
Westpreussen	30,8	»	20,8	»
Posen	21,3	»	34,8	»

Rechnen wir nun das Bier im Durchschnitt zu 5 %, den Branntwein zu 50 % Alcoholgehalt, so können wir folgende Mengen von Alcohol für den Kopf der Bevölkerung in diesen Gegenden berechnen:

Bayern	2,4	+	22,3	=	26,7	d. i.	13,4	reiner Alcohol
Sachsen	9,6	+	10,5	=	20,1	» »	10,0	» »
Schlesien	18,8	+	4,9	=	20,7	» »	10,4	» »
Pommern	20,5	+	3,1	=	23,6	» »	11,8	» »
W.-Preussen	20,8	+	3,1	=	23,9	» »	12,0	» »
Posen	34,8	+	2,1	=	35,8	» »	17,9	» »

Eine wie grosse Uebereinstimmung somit hinsichtlich des Consums von reinem Alcohol zwischen den nördlichen und südlichen Gegenden des deutschen Reiches besteht, so äussert sich der Gebrauch dieses Nähr- und Genussmittels, je nach der Concentration, in der es dem Organismus einverleibt wird, in verschiedener Weise auf die einzelnen Organe. Beredtes Zeugniß davon liefern die Jahresberichte einzelner pathologischer Institute, die ich des Vergleiches halber zusammengestellt habe.

Bei uns in Süddeutschland äussert sich der Alcoholmissbrauch in der bei habituellen Trinkern fast constanten Veränderung des Herzens und zwar der Hypertrophie. Diese Erkrankung des Herzmuskels wird auf vielfache Weise durch den Alcoholmissbrauch bedingt. Der Alcohol steigert, wie wir wissen, die Herzmuskelaction und die Pulsfrequenz. Mit der Vermehrung der Arbeitsleistung erleidet aber jeder Muskel eine Zunahme an seiner Masse und an seinem Volumen. Diese Hypertrophie des linken Ventrikels, die eigentlich nur den Ausdruck der compensatorischen Wirkung der vermehrten Muskelarbeit darstellt und wie schon erwähnt in einer Vermehrung der Muskelfibrillen in der Herzwandung besteht, wird weiterhin dadurch verursacht, dass das Herz eine ganze Reihe von Widerständen, die durch die Zufuhr von übermässiger Flüssigkeit in den Blutstrom eingeschaltet werden, überwinden muss.

Mit der dem chronischen Alcoholismus charakteristischen allgemeinen Ablagerung von Fett auf und um die einzelnen Organe, mit der weiterhin stattfindenden Fettinfiltration in den Herzmuskel selbst wird die Arbeitsleistung des Herzens vermehrt nicht weniger wie durch die Cirkulationsstörungen im kleinen Kreislaufe (Bronchialkatarrhe, Emphysem etc.) und im Pfortadergebiete (Fettleber, Cirrhose etc.); ein fernerer wichtiges, wenn auch nicht zu überschätzendes Moment für die Hypertrophie des Herzmuskels und ganz besonders des linken Ventrikels liegt in dem Verhalten der Niere im chronischen Alcoholismus. In diesen findet nämlich, wie in der Leber nach Baer eine fettige Degeneration und eine durch interstitielle Bindegewebsneubildung entstehende Induration mit Granularatrophie statt und wie Traube erwiesen, ist die Folge dieser Schrumpfung des Nierenparenchyms und des Unterganges einer Zahl von kleinen Blutgefässen, eine Vermehrung der Widerstände in dem Blutstrom, eine Erhöhung des Blutdruckes in dem Aortensystem und desshalb eine Dila-

tation und Hypertrophie des linken Ventrikels. Eine weitere Ursache für diese letztere liegt auch in dem Verhalten der kleinen Gefässe, die in Folge des Alcoholmissbrauches eine Erweiterung ihres Lumens erleiden. In den erweiterten Blutgefässen ist der Blutstrom immer bedeutend verlangsamt; es treten Stauungserscheinungen auf, die dem Herzmuskel einen Widerstand entgegensetzen und eine vermehrte Arbeit verursachen. Endlich ist noch die atheromatöse Erkrankung der arteriellen Gefässe hervorzuheben, die ein bedeutendes Hinderniss für die Blutcirculation abgibt und consecutiv eine Hypertrophie des linken Ventrikels bewirkt. Zu der Hypertrophie des linken Ventrikels tritt sehr bald eine Dilatation desselben hinzu, wenn der compensatorische Effect zur Ueberwindung der im Kreislaufe vorhandenen Widerstände nicht ausreicht und durch die nunmehr im ganzen Kreislauf gesetzten mechanischen Störungen wird sehr bald auch eine Miterkrankung des rechten Herzens, eine Hypertrophie desselben verursacht. In den späteren Stadien des Alcoholismus äussert sich die Ernährungsstörung in der fettigen Degeneration des Herzmuskels. So beschreibt Ruge (Virchow's Archiv Bd. 49 S. 262) bei seinen Versuchen nach acuter oder chronischer Alcoholintoxication in drei Fällen hochgradige fettige Degeneration des Herzmuskels.

Die Frage, wie diese Veränderung der Muskelprimitivbündel bei chronischem Alcoholismus zu Stande kommt, möchte ich weniger im Sinne Buhls, der sie als Ausgang einer entzündlichen Reizung mit fettigem Zerfall hinstellt, als vielmehr im Sinne Ponficks beantworten. Darnach wäre die fettige Degeneration des Herzens bei chronischem Alcoholismus eine Folge der toxischen Wirkung des Alcohols, wie sie ähnlich bei Phosphorvergiftung auftritt. Die allgemeine Herzverfettung hingegen dürfte aus der mangelhaften Versorgung des Herzens mit Blut herzuleiten sein. Diese mangelhafte Versorgung wird nach Ponfik dadurch verursacht, dass der Alcohol bei älteren Leuten hauptsächlich Sclerose des Aortensystems, Rigidität der Kranzarterien, bei jüngeren dagegen hochgradige Anämie, eine bedeutende Veränderung der rothen Blutkörperchen und grosse Armuth an Fibrin verursacht.

Im Gegensatze zu Buhl, der die Myodegeneratio cordis als aus einem entzündlichen am Herzen abgelaufenen Prozesse entstanden betrachtet, möchte ich die fettige Metamorphose des Herzmuskels als das Endstadium der Hypertrophie des Muskels hinstellen. Damit wäre vielleicht auch ein Zusammenhang, der allerdings von Leyden bestritten wird, zwischen fettiger Degeneration und fettiger Infiltration des Herzmuskels, wie er vielfach angenommen wird, zu erklären. Wenn wir weiterhin die ätiologischen Momente der Herzhypertrophie speciell den chroni-

schen Alcoholismus als sie bedingend hervorheben, so dürfte dieser im vorliegenden Falle als eines der hauptsächlichsten betont werden, das jene drei Zustände der Hypertrophie und Dilatation, secundär das Cor adiposum und als Endstadium dieser die fettige Degeneration des Herzmuskels bewirkt. Damit soll allerdings nicht bestritten werden, dass sich der eine oder andere Zustand ohne den zweiten und dritten entwickeln kann und sich in einzelnen Fällen auch wirklich entwickelt, aber für gewöhnlich dürfte die Myodegeneratio cordis erst einen schon hypertrophischen Muskel befallen.

Zum Schlusse erübrigt mir noch die angenehme Pflicht, meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. Bollinger, für die mir bei vorliegender Arbeit ertheilten Rathschläge meinen wärmsten Dank auszusprechen.



QUELLEN-ANGABE.

- Schmidt's* Jahrb. Bd. 24. Referat über Memoires de la société medicale d'observation de Paris 1836.
Schmidt's Jahrb. Bd. 85 und 86. Monthly Journal of medical sciences London 1854.
Beneke, die anatomischen Grundlagen der Constitutionsanomalieen des Menschen Marburg 1878.
Müller, die Massenverhältnisse des menschl. Herzens, Jena 1883.
Stein, Myocarditis, München 1861.
Charité, Annalen 1877 u. 1878.
Buhl's Mittheilungen aus d. pathol. Institute, Stuttgart 1878.
Annalen des Münchener Krankenhauses 1876—1877.
Rosenthal, Bier und Branntwein, Erlangen.
C. Binz, über Alcoholgenuss, Controlblatt für allg. Gesundheitspflege B. I.
Münzinger, das Tübinger Herz, Ziemssen's Archiv f. klin. Med. Bd. 19.



Tab. I.

Hypertrophie und Dilatation des Herzens.

A) Idiopathische Erkrankungen. *)

I. Rein idiopathische Hypertrophie und Dilatation des Herzens.

a) Die Herz-Erkrankung als Todesursache.

I. Männer.

Nr. d. Sect.-Ber.	Alter	Stand	Rechter V.			Linker V.			Körper- Länge	Körper- Gewicht	Gewicht d. Herzens
			H.	P.U.	V.D.	H.	A.U.	V.D.			
265	22	Metzger . . .	10	8	0,8	9	7	2			400
197	27	Säckler . . .	9	8	0,8	7,5	7	1,3	143	42	400
169	21	Praktikant . .	10	8	0,6	10	7	1,5	173	54	410
146	28	Bräugehilfe . .	10	7,6	0,3	11	7,3	1,2	165	55	375
214	28	»	11	9,5	0,4	11	8	1,5			435
554	29	Viehhändler . .	9,6	8,4	0,7	9,7	6,8	1,7	164	75	395
45	34	Wirth	9	8,3	0,4	9,5	7,6	1,8	164	61	420
148	32	Schäffler . . .	9,8	7	0,5	10	6,9	1,5	160	51	360
217	37	Knecht	10	7,5	0,7	8,5	7	1,5	160	57	345
78	39	Kellermeister .	9,9	8,5	0,6	9,4	7,1	2	175	56	395
438	31	Schaffner . . .	11	8	0,2	10,2	8,2	1,4	169	75	400
396	42	Knecht	11,2	8,5	0,6	9,5	7,8	1,3			460
17	43	Bräugehilfe . .	11,1	8,5	0,6	10,1	7,6	1,3	163	50	400
114	44	Leichenträger .	10	8,5	1,0	9	7,5	1,5	168	72	455
227	45	Schweizer . . .	9,5	8,5	1	11	7	2,5	173	96	680
170	44	Händler	11,5	9,3	0,5	9,5	8	1,4	169	74	470
222	46	Maurer	11,5	8,5	0,6	10	7,5	1,7	160	62	430
195	47	Schmiedgehilfe .	12,5	9	0,6	11,5	8,7	1,4	161	70	570
80	47	Priester							180	95	480
360	51	Packträger . . .	10,5	9	0,7	10,5	8	1,5	163	53	450
325	51	»	10	9,2	0,8	10	8,1	1,5	176	76	495
226	55	Controleur . .	8,5	8	0,8	9,5	8	2		75	610
123	57	Bäcker	11,3	9,5	0,6	9,5	8,5	2	166	92	730
329	57	Schneider . . .	11	7,5	0,5	11,2	7,2	1,1	168	56	410
415	58	Anstreicher . .							160	53	470
32	59	Stiefelputzer .	10,5	9,1	0,3	10	8,2	1,5	158	42	395
140	60	Tagelöhner . .	11,5	9	0,8	9,5	7,8	1,5	173	55	530
25	60	Metzger	8	7,5	0,8	8	7,5	2	158	53	365
278	60	Hauptmann . .	11,5	8	0,8	11,5	7,5	2	175	71	600
286	65	Wirth	10,5	8	0,7	10	8	1,6	158	70	450
110	68	Privatier . . .	9,5	8,3	0,7	11,2	8,8	1,6	163	58	375
37	64	Schneider . . .	9	8,8	0,6	9,1	8,3	1,8	151	55	380

*) Mit und ohne Degeneration des Herzmuskels; diese Fälle wurden nach Buhl von Spatz (Einfluss von Krankheiten auf die Grösse des Herzens, Ziemssen's Archiv Bd. XXX) als chronische Myocarditis bezeichnet, werden klinisch im hiesigen Krankenhause unter dem Sammelnamen der Myodegeneratio zusammengefasst.

II. Weiber.

Nr. d. Sect.-Ber.	Alter	Stand	Rechter V.			Linker V.			Körper- Länge	Körper- Gewicht	Gewicht d. Herzens
			H.	P. U.	V. D.	H.	A. U.	V. D.			
347	44	Tagelöhnerin . .	8,5	9,5	0,4	9,5	7,5	1,4	147	46	425
389	24	Färbersfrau . .	10,3	7,3	0,3	8,5	6,2	1,4	151	47	330
460	48	Putzmacherin . .	10,5	7,6	0,5	10,4	5,5	2	151	47	420
514	53	Köchin . . .	11,5	7,2	0,4	9,2	7	1,8	155	64	425
304	54	Zugeherin . . .	10	8	0,6	9,5	7	1,3	136	49	385
122	56	Rentbeamit. -We.							150	45	600
375	60	Fuhrmannsfrau .	12	8	0,5	11,5	7	1,6	161	62	520
46	65	Köchin . . .	9,8	9,2	0,3	8,6	8,1	1,3	145	58	340
24	58	Schuhmachersfr.	9,5	8,2	0,4	10,2	7,3	1,2	156	54	365
552	71	Wärterin . . .	11,1	9,8	0,5	9,5	8,1	1,5	147	58	470
369	72	Näherin . . .	8,5	8,3	0,5	7	7,5	1,8	152	38	430
403	60	Kindsfrau . . .	11,3	8,1	0,6	10,7	7,4	0,9	146	44	490
493	79	Putzerin . . .	9	7,6	0,4	9,3	8,2	0,5	154	40	345
57	73	Magd	9,1	7,3	0,4	8,4	1,9	1,6	135	32	380



Tab. II.

I. Rein idiopathische Hypertrophie und Dilatation des Herzens.

b) die Herzerkrankung war nicht Todesursache.

I. Männer

Nr. d. Sect.-Bef.	Alter	Stand	Rechter Vent.		Linker Vent.		Körper- Länge	Körper- Gewicht	Gewicht d. Herzens	Todesursache
			H.	P. U.	V. D.	H.	A. U.	V. D.		
365	22	Maurer	9,7	8,9	0,5	8,2	8,5	2,3	395	Croup. Pneum.
169	30	Schreiner	10	7,3	0,7	9,5	6,8	1,6	455	Arsenikvergiftung
426	31	Metzger	11,2	7,8	0,8	10,5	6,6	1,7	365	Schuss ins Hirn
188	32	Zimmermann	10,3	6,9	0,5	10	7,3	1,8	405	Fract. cranii
44	31	Fuhrknecht	11,2	9,3	0,5	9,2	8,7	1,2	400	Peritonit. purul.
411	38	Müller							430	Apoplexia cerebri
290	39	Arzt							375	Morphiumvergiftung
300	41	Fuhrmann	8,5	7	0,7	10	7	1,6	325	Croup. Pneum.
362	49	Schuster	11,5	9	0,7	11	7	1,2	500	Sepsis
477	46	Knecht	10	8,6	0,4	10,5	8,2	1,2	450	Apoplexia meningea
339	49	Kupferschmied	9	8,5	0,3	9,2	7,5	1,1	370	Sepsis
222	46	Maurer	11,5	8,5	0,6	10	7,5	1,7	430	Compl. Fract.
564	51	Schneider	9	8	0,7	8,5	8	1,7	390	Amput. fem.
257	55	Beamter							500	Carcin. recti
175			11,3	7,2	0,5	11,5	8,3	1,8	505	Apopl. cerebri
427	57	Wechselwärter	12	9,5	0,4	11	9	1,5	340	Neoplasm. maxill. sup.
372	48	Tagelöhner	11	7	0,4	10,5	8,5	0,4	370	Compl. Rippenfractur
226	55	Controlleur	8,5	8	0,8	9,5	8	2	610	Tod durch Ertrinken
60	59	Packträger	10,9	7,6	0,6	9,8	8,2	2	470	Carcin. ventr.

Nr. d. Sect.-Ber.	Alter	Stand	Rechter Vent.		Linker Vent.			Körper- Länge	Körper- Gewicht	Gewicht d. Herzens	Todesursache
			H.	P. U.	V. D.	H.	A. U.	D. V.			
483	40	Schneider	8,9	6,2	1,8	8,6	6,3	1,5	126	33	Typh. abdom.
340	74	Glasschleifer . . .	10	10,2	0,8	9,5	9,3	1,2	158	61	Pneum. desquam.
535	76	Professor	10 "	10	0,3	10	9	1,7		525	Periton. perfor.
177	83	Beamter							49	410	Pneum. croup.
II. Weiber											
492	24	Köchin	9	8	0,5	8	6,5	1,5	161	60	(Myodeg. cord.) Phosphorvrgg.
159	30	Zimmermädchen . .	9	8	0,5	8	6,5	1,7	155	46	Ulc. ventr.
252	38	Schustersfrau . . .	10,5	7,3	0,3	10,5	6,1	1,4	155	53	Carcin. uteri
398	38	Tagelöhnerin . . .	11	8,5	1,1	11	7,6	1,3	156	65	Sepsis puerp.
518	43	Putzerin	11,2	7,6	0,3	11,3	7	1,4	155	68	Neoplasm. cerebri
427	51	Bäckers-Wwe. . . .	8,2	7,7	0,5	10,1	8	1,9	150	46	Carcin. d. l. Ovariums.
23	54	Schmieds-Wwe. . .	10,8	8,5	0,5	9,6	7,2	1,3	147	42	Carcin. ut. et vag.
567	63	Schmieds-Wwe. . .	10	9,5	1,2	8,3	9,3	1,5	152	36	Pneum. chron. interst.
79	65	Posamentiers-Wwe.	8	7,1	0,4	8,5	7	2,2	150	34	Apoplexia cerebri
526	76	Oekonomenstochter	10	8,2	0,3	8,5	7,5	2,1	152	34	Apoplexia cerebri.



Tab. III.

Hypertrophie und Dilatation des Herzens.

b) Secundäre Erkrankungen hauptsächlich nach Granularschwund der Nieren,
Arteriosclerose Lungenemphysem.

I. Männer

Nr. Sect.-Ber.	Alter	S t a n d	Rechter Vent.		Linker Vent.			Körper- Länge	Körper- Gewicht	Gewicht d. Herzens	Todesursache
			H.	P. U.	V. D.	H.	A. U.	V. D.			
158	12	Gärtnersohn . . .	8	5,9	0,2	8,2	5,2	1,5	130	290	Nephrit. interstit. Apoplexia cerebri.
8	18	Hafner . . .	11	6,6	0,3	10,5	5,7	1,2	160	455	Nephrit. post scarlat.
432	10	Schreinerskind . . .	7	5,7	0,3	7	5	0,9	113	180	»
490	21	Conditor . . .	10	7,2	0,3	9,7	6,4	1,5	162	490	Granularatr. d. Nieren
124	25	Weinändler . . .	10	7,6	0,5	9,5	6,4	1,8	151	345	»
144	26	Hafner . . .	10,2	9	1	9	7,5	2,3	170	405	»
182	27	Monteur . . .	10,5	7,5	0,8	10,7	6,2	1,5	167	53	»
240	28	Privatier . . .	10,5	7,5	0,8	10,7	6,2	1,5	162	53	»
444	29	Kurscher . . .	12,4	8,1	0,7	11,8	6,4	1,5	172	88	»
29	32	Schuhmacher . . .	12,3	8,5	0,5	10,9	7,4	2,3	167	49	Nephrit. chron.
10	34	Bräugchilfe . . .	12,2	9,1	0,5	11,1	8,1	1,3	165	410	Granularatr. d. Nieren
107	34	Maler . . .	10,7	8,4	0,6	11,7	6,7	2	163	660	»
102	35	Tagelöhner . . .	9	7,5	0,4	8,8	6,6	1,2	153	270	»
65	37	Kunständler . . .	10,2	7,6	0,5	9	7	1,2	163	450	»
208	38	Schreiner . . .	10,5	8	0,8	9	8,2	1,2	175	360	»
314	39	Packträger . . .	10	8,5	0,7	9	7	1,2	152	520	»
204	42	Maurer . . .	10	8,5	0,7	9	7	1,2	152	375	»

Nr.	Alter	Stand	Rechter Vent.			Linker Vent.			Körper- Länge	Körper- Gewicht	d. Herzens Gewicht	Todesursache
			H.	P.	U.	V. D.	H.	A. U.	V. D.			
202	43	Holzacker	8,5	7,5	7,5	0,4	9,5	7	2,2	164	420	Granularatr. d. Nieren
322	43	Tagelöhner	10,7	8,8	8,8	0,6	10	8,6	1,2	168	450	»
430	41	Knecht	12	7	7	0,9	12	7	1,5	162	85	»
156	47	Tagelöhner	11	7,8	7,8	0,6	10,9	8,2	1,5	163	87	»
48	48	Schuhmacher	10,5	8,1	8,1	0,5	11	7,2	1,3	152	700	»
506	41	Schneider	9	8	8	0,6	9	7	2,4	158	600	»
61	50	Zimmermann								156	48	Nephrit. chron.
355	52	»	12	9,1	9,1	0,6	11,5	8	1,3	175	530	Althermatose
51	55	Tagelöhner	10,9	8,8	8,8	0,5	10,8	8,7	1,5	170	595	Granularatr. d. Nieren
500	55	Aufseher	9,5	7	7	1,2	7,5	7,5	2,1	162	380	»
230	54	Maurer	11	10	10	0,8	8,5	8	1,8	169	355	Nephrit. chron. interst.
11	56	Zimmergeselle	11	10,7	10,7	0,3	10,5	9,1	0,9	154	520	Granularatr. d. Nieren
232	56	Tagelöhner	10	8	8	1,4	10	8,5	2,5	159	335	»
40	59	Schäfer	10,4	8,5	8,5	0,7	9,7	7,8	1,3	153	550	»
13	58	Schreiber	11	8,8	8,8	0,2	10,5	8,3	2	164	435	»
192	56	Güterlader	13,7	8,4	8,4	0,7	13,5	10,6	1,8	160	810	»
528	59	Tagelöhner	12	9	9	0,9	11,1	7,8	1,8	162	475	(Pericarditi puri)
178	61	Knecht	9,7	7,3	7,3	0,3	9,7	8,7	1,7	170	345	»
294	61	Tagelöhner	10	9	9	0,9	9	8,5	1,5	162	345	Apoplexia cerebri
126	62	Packträger	10,5	8,3	8,3	0,8	9,8	7,9	1,3	162	485	»
376	66	Kaminkehrer	10,5	9,5	9,5	0,9	9,5	8,3	1,4	167	350	»
										77	365	Atheromatose der Coronar- arterien.
320	68	Tagelöhner	11	10,3	10,3	0,7	10,5	8,6	1,1	158	580	Granularatr. d. Nieren
157	68	Maurer	9,5	8,5	8,5	1,7	9,4	7,4	1,5	154	405	»
332	69	Tagelöhner	11	9	9	0,6	11,5	8,5	1,1	164	565	»
353	67	Retoucheur	8	8,5	8,5	0,6	9	8	2,2	157	37	»
284	70	Arzt	8	9,8	9,8	0,7	9,5	9,5	2	166	600	»
150	72	Tagelöhner	10,1	7,8	7,8	0,6	9,7	8,9	1,3	150	330	»

Tab. IV.

Cor adiposum fand sich in folgenden Fällen:

I. Männer

Nr. I. Sect.-Ber.	Alter	S t a n d	Rechter Ventr.		Linker Ventr.		Körper- Länge	Körpergewicht	Gewicht d. Herzens	T o d e s u r s a c h e
			H.	P. U.	V. D.	H.	A. U.	V. D.		
134	35	Kaufmann . . .	11	8,1	0,9	11	7,5	1,6	440	Schuss in den Kopf
150	47	Schauspieler . .							450	Acute Septicaemie
187	45	Tapezierer . . .	9	8	0,8	9	8,5	1,5	380	Schuss in den Bauch
258	69	Sekretär	12,3	8,8	0,7	11,4	8,4	1,5	535	
261	52	Metzgergehilfe .	9,5	8	0,8	9	8,5	1,3	330	Phthis. pulmon
328	42	Steinmetz . . .	9,1	7,6	0,6	9,7	6,9	1,6	320	Pneum. group
419	47	Architekt . . .	7	7	0,4	8	7	1,5	270	
38	52	Locomotivführer .	10	8,9	0,5	9,0	7,7	0,9	450	
191	50	Musiker	11,5	9,0	0,8	10,0	8	1,7	625	
238		"	10	8,8	0,4	9,5	8,5	1,5	300	
347	68	Schuhmacher . .	9	7,5	0,4	7	8	1,2	225	Phthis. pulm.
385	37	Hafner	9	7	0,5	8,2	6	1,4	315	Carcinoma oesophagi.
405	42	Fuhrknecht . . .	10	7,2	0,4	9,2	6,8	1,5	275	Pneum. group
417	24	Zimmergeselle .	11	7	0,5	10	7	1,5	370	"
242	81	Tagelöhner . . .	8,5	8	0,7	8	8	1,0	255	Compl. Fract. des Unterkiefers
437	57	Maler							600	
8	37	Bildhauer	9,5	7,1	0,7	9,3	6,7	1,5	370	Septicaemie
17	30	Schreinergehilfe .	12	8,5	1,0	11,0	7,0	2,3	810	Phthis. pulm.
19	51	Ministrant . . .							153	
341	66	Officiant	11,3	10,3	1	11,5	8,5	1,4	510	Cor adipos.
										Morb. Bright
										Atheromatose d. Aorta
										Cirrhos. Muscatnussleber
										Atroph. Muscatnussleber
										Atroph. Narbennier. (175)

II. Weiber

d. Sect.-Ber. Nr.	Alter	S t a n d	Rechter Ventr.		Linker Ventr.		Körper- Länge	Körpergewicht	Gewicht d. Herzens	T o d e s u r s a c h e		
			H.	P. U.	V. D.	H.					A. U.	V. D.
230	60	Lehrerin						159	74	415	Fract. colli fem.	
310	48	Ausgehehrs-frau . .	10	8,5	1,0	10,5	7,9	1,2	152	79		440
405		Ausgeherin	7,5	7,5	0,6	7,5	7	1,6	147	45	270	Carcin. pylori
455	27	Magd	9,6	7,9	0,3	10,6	7,3	1,4	156	56	315	Retroperton. Abscess
271	50	Optikers-Wittwe . .	8	8	0,5	8	7	1,8			320	Doppelseit. Pneum.
274	53	Magd	10	8,4	0,6	10	7	1,2	150	60	300	Eiterige Peritonit.
291	28	Steinmetz-frau . .	9,5	7	0,4	8	5,5	1,0	146	33	250	Phthis. pulm.
197	75	Kanzleidners Ww. . .	8	8,5	0,6	7,5	7,2	1,5	151	43	340	Granulartr. der Nieren, Atheromatose d. Aorta
25	52	Tagelöhners-Ww. . .	8,5	7,5	0,4	8,0	7,0	1,2	149	43	265	
29	29	"									330	Septicopyaemie
53		Haushälterin . . .	7,5	6,5	0,8	7,5	6,5	1,5	150	39	250	Phthis. comb.
												Bicusp.
												Granulartr. der Nieren, Endocardit. d. Aorta u.
18	43	Dienstmanns-frau . .	9,5	8,5	0,6	9,3	7,8	1,5	159	67		Pericardit. fibrin
200	68	Wäscherin	7	6,5	0,3	6,5	6,0	1,2	127	30	210	» » »
273	43	Maurers-frau . . .	10	8	0,3	10	8	1,5	175	45		» » »
												Caries d. III. Lend.-Wirbels

Klappenfehler.

I. Männer

II. Weiber

Alter	I. Männer				II. Weiber			
	Körper- Länge	Körper-Gew.	Gewicht d. Herzens	Bezeichnung des Klappenfehlers	Körper- Länge	Körper-Gew.	Gewicht d. Herzens	Bezeichnung des Klappenfehlers
10 bis 20	159 155 167 175 155	59 42 54 64 42	525 320 600 580	Relat. Insuff. d. Tricusp. und Aorta Stenose u. Insuff. d. Mitralis " " " Aorta Insuff. d. Aorta, Endocard. chron. d. Mitral. und Aorta	144 159 154	36 42 56	520 230 240	Insuff. d. Aorta Stenose d. Aorta Endocardit chron. fibr. d. Mitralis
20 bis 30	134 150 164	55 54 49	365 595 500 675	Insuff. d. Mitralis Insuff. und Stenose d. Aorta Insuff. d. Aorta, Endocardit. chron. d. Aorta Stenose und Insuff. d. Aorta	120 156 145 147 149 152	60 25 37 48 54 33	130 205 320 320 340 185	Endocardit. verrucos d. Bicusp. (e puerp.) " chron. fibr. d. Bicusp. " valv. verruc. " mycot. d. Aorta u. Bicusp. (e puerp.) " " " " " veruc. " Stenose u. Insuff. d. Mitralis Insuff. d. Mitral. Endocard. chron. fibr. et verruc. d. Mitralis Stenose d. Mitralis " " Endocard. diphther. d. Mitr. " " " mycot. "
30 bis 40	163 168 164	52 65 57	480 600 500	Insuff. u. Stenose d. Aorta, Sten. d. Tricusp. " " Mitralis " der Aorta (Percardit. purul.)	154 142 153	43 54 53 42	290 340 365	Insuff. d. Tricusp. Sten. u. Insuff. d. Aorta u. Biscup. Sten. d. Tricusp. " " " Mitral.

I. Männer

II. Weiber

Alter	Bezeichnung des Klappenfehlers			Bezeichnung des Klappenfehlers		
	Körper- Länge	Körper-Gew.	Gewicht d. Herzens	Körper- Länge	Körper-Gew.	Gewicht d. Herzens
30 bis 40	162	46	345	Insuff. d. Bi- und Tricusp.	151	38
	172	62	390	» d. Aorta (Pericare adh.)	143	37
	173	66	425	Endarteritis fibr. d. Aorta	154	54
	175	68	570	Insuff. d. Aorta, Rel. Insuff. d. Tricusp.	149	39
				(Chron. Endocard. d. Mitr. u. Aorta)	141	51
	175	66	530	Insuff. und Stenose d. Aorta	151	53
	156	50	490	Endocard. chron. fibr.	148	36
	160	47	330	» calcul. d. Aortakl.	145	36
	162	36	310	» » »	150	41
	125	65	495	Rel. Insuff. d. Tricusp.	150	41
40 bis 50	164	71	410	Insuff. d. Tricusp.	146	44
	171	54	700	Insuff. u. Stenose d. Aorta	149	62
	169	55	375	Endocardit. verrucosa	158	72
	148	54	345	Insuff. d. Aorta	148	55
	164	58	680	Stenose & Ins. d. Aorta, Endocard. chron.	154	77
	150	57	390	Rel. Ins. d. Tricusp.	157	58
	164	41	220	Endocard. valv. verruc.	151	47
				Insuff. d. Tricusp.	146	44
				Insuff. u. Stenose d. Aorta	149	62
				Endocardit. verrucosa	158	72
50 bis 60	156	47	330	Stenose d. Mitralis	157	41
	157	79	620	Insuff. d. Aorta	160	40
				Stenose u. Insuff. d. Aorta	142	62
				Endocard. chron. fibr.	143	54
	157	77	270	Stenose u. Ins. d. Aorta	150	39
	158	65		Endocardit. calc. (Pericard)	153	37
	160	65	530	Rel. Insuff. d. Aorta	153	37
				Stenose d. Mitral. (Endocard. valv. fibr.)	151	38
				» d. Mitralis (Endocard. chr. d. Mitr.)	143	37
				» u. Insuff. d. Mitr. Insuff. d. Aorta (Endocard. verruc. d. Aorta)	154	54
30 bis 40	175	68	570	Insuff. d. Aorta, Rel. Insuff. d. Tricusp.	149	39
				(Chron. Endocard. d. Mitr. u. Aorta)	141	51
	175	66	530	Insuff. und Stenose d. Aorta	151	53
	156	50	490	Endocard. chron. fibr.	148	36
	160	47	330	» calcul. d. Aortakl.	145	36
	162	36	310	» » »	150	41
	125	65	495	Rel. Insuff. d. Tricusp.	150	41
				Insuff. d. Tricusp.	146	44
				Insuff. u. Stenose d. Aorta	149	62
				Endocardit. verrucosa	158	72
50 bis 60	156	47	330	Stenose d. Mitralis	157	41
	157	79	620	Insuff. d. Aorta	160	40
				Stenose u. Insuff. d. Aorta	142	62
				Endocard. chron. fibr.	143	54
	157	77	270	Stenose u. Ins. d. Aorta	150	39
	158	65		Endocardit. calc. (Pericard)	153	37
	160	65	530	Rel. Insuff. d. Aorta	153	37
				Stenose d. Mitral. (Endocard. valv. fibr.)	151	38
				» d. Mitralis (Endocard. chr. d. Mitr.)	143	37
				» u. Insuff. d. Mitr. Insuff. d. Aorta (Endocard. verruc. d. Aorta)	154	54

I. Männer

II. Weiber

Alter	I. Männer			II. Weiber		
	Körper- Länge	Körper-Gew.	Gewicht d. Herzens	Bezeichnung des Klappenfehlers	Bezeichnung des Klappenfehlers	
50 bis 60	161 37	230		Insuff. d. Aorta	Rel. Insuff. d. Mitralis, » » Tricusp. Stenose d. Bi- u. Tricusp.	
60 bis 70	155 159 170 158 162	44 71 54 48 50	290 485 500 290	Stenose d. Tricusp. (Endocard. mycot) Stenose d. Bicusp. (Endocard. chron. fibr. d. Bi- u. Tric.) Insuff. d. Aorta Endocard. chron. fibr. d. Mitral. (Pericard. adh.) » » d. Aorta u. Bicusp. (Gra- nular-Nieren) Endocard. chron. d. Mitral. (Granular-Nieren) Stenose d. Mitralis u. Aorta Relat. Insuff. d. Mitralis Endocardit d. Mitralis	Stenose d. Mitral. Endocard. chron. calcul. Insuff. » » » Stenose d. Aorta » » calcul. Endocard. chron. » » valvul. retrah. » fibr. valvul. (Cor adipos.) » chron. d. Mitral. » » d. Bi- u. Tricusp. (Lebercirrhose) » » fibrosa » calcul. d. Aorta » veruc. d. Mitral. (Cor adipos.)	300 235 405 250 560 325 330 195 380 270
70 bis 80	154 160 168 166	54 45 65 51	410 310 460 350	Sten. d. Mitral. Insuff. d. Tricusp. Chron. Endocardit. Endocard. chron. fibr. d. Mitral. u. Tricusp. Endocard. calcul. d. Aortakl. Insuff. d. Bicusp.	Insuff. d. Aorta » » Tricusp. » » Endocardit. chron. » » d. Mitral. u. Aorta » » d. Aorta	54 38 285 40 250 62 350 275 245
80 bis 90	173 148	44 56	290 465	Insuff. d. Mitral. u. Tricusp. (Endocardit. chr. fibr.) Endocardit. calcul. d. Mitral. u. Aorta	Endocardit. valv. chron. calc. d. Mitral. u. Aorta Stenose d. Bicusp.	245 320

Tab. VI.

Grosse Herzen bei Phthisis pulm.*)

Nr. d. Sect.-Ber.	Alter	S t a n d	Recht. Vent.			Linker Vent.			Körper- Länge	Körper- Gewicht	Gewicht d. Herzens
			H.	P. U.	V. D.	H.	A. U.	V. D.			
248	21	cand. jur. . . .	10	8	0,6	9	7	1,5	163	59	390
240	27	Mechaniker . . .	9,5	7,5	0,4	9	7	1,8	160	70	390
300	28	Lieutenant . . .	10	8	0,7	10,5	6,5	2			440
451	24	Metzger	10,5	8,6	0,4	9,1	7,4	1,2	175	56	355
153	26	Schäffler	10,6	7,5	0,2	10,1	7,5	1,1	173	60	410
421	27	Maler	11	8,8	0,3	10,5	7,5	1,4	180	54	370
93	28	cand. med. . . .	11,3	7,4	0,8	11,1	7	1,3	177	78	405
465	30	Ausgeher	11,1	7,8	0,5	10,8	6,8	1,3	162	60	340
580	32	Schieferdecker .	10,7	8,1	0,5	10,5	8,6	1,5	164	67	375
129	34	Knecht	10	8	0,3	9,3	7,5	1,5	182	41	410
179	33	Expeditör	8	7,5	0,4	9	6,5	1,5	162	44	280
223	34	Baurechner . . .	10	8	0,4	10,5	7,5	1,2	170	52	310
412	26	Schreiner	11	7	0,3	9	8	1,8	167	61	360
13	33	Tagelöhner . . .	10,6	8,4	0,6	10,2	7,7	1,2	175	50	335
84	37	Metzger	10,9	7,3	0,3	9,9	7,3	1,7	163	52	395
136	42	Schreiner	11	6,9	0,3	11	6,7	1,5	164	60	420
395	43	Schuhmacher . . .	12,2	8,3	0,2	11,9	7,6	1,1	185	49	315
316	45	Ausgeher	9,5	8,2	0,7	9,5	7,5	1,3	161	46	420
100	46	Maurer	10,2	8,2	0,6	9	8,7	1,6	167	56	410
313	52	Marqueur	11,1	7,1	0,7	11,3	7,1	1,3	154	55	400
209	52	Kapellmeister . .	10	9,5	0,8	10	7,5	1,5	165	57	415
356	53	Ministrant	10	8,9	0,3	8,9	8,2	1,3	175	70	410
289	54	Fabrikant	11	9	0,7	9,5	8	1,4	165	45	395
211	56	Officiant	8,5	8	0,4	8,5	8,5	2	165	38	400
267	56	Tagelöhner	10	8	0,3	9,5	7,7	1,4	155	47	310
206	62	Melber	9	8	1,0	8,5	8	1,5	164	61	370
383	76	Austrägl.-Ww. . .	10	8,5	0,7	9	7	2,6	147	58	510

*) Zweifelhafte Fälle, wobei sich mässige Vergrösserung des Herzens, besonders auch des rechten Ventrikels fand, sind nicht berücksichtigt worden.



